

## Informationen für zuweisende Ärztinnen und Ärzte

### MRT

- Kontraindikationen:
  - Schwangerschaft in den ersten 3 Monaten; danach strenge Indikationsstellung
  - elektronische Geräte wie Herzschrittmacher, Insulinpumpe, Innenohrimplantat, Neurostimulator, etc.
  - nach Gelenkprothesenanlage innerhalb der ersten 6 Wochen
- Sedierung bei Platzangst möglich; Patient muss in Begleitung erscheinen!
- MRT Abdomen (insbes. Abklärung der Gallenwege) nur nüchtern (mind. 8h)
- wir verwenden ausschließlich Gadolinium-haltige Kontrastmittel der höchsten Sicherheitsstufe

### CT und Durchleuchtung

- Kontraindikationen:
  - Schwangerschaft
  - Kinder und Jugendliche nur bei strengster Indikationsstellung

### Untersuchungen mit jodhaltigem Kontrastmittel (CT und Durchleuchtung)

- Kontraindikationen:
  - Multiplem-Myelom (keine absolute KI)
  - eingeschränkte Nierenfunktion (erhöhtes KREA, altersangepasst)
- wir benötigen aktuelle Blutwerte: Kreatinin, GFR, TSH basal
- Metformin: 2 Tage vor und 2 Tage nach der Untersuchung pausieren
- bei TSH-basal < 0,27 bitten wir im Vorfeld der Untersuchung um eine endokrinologische Abklärung; sofern uns keine anderen Informationen vorliegen verabreichen wir Patienten mit subklinischer oder manifester Hyperthyreose vor der Untersuchung 40 gtt Irenat (wir empfehlen in diesen Fällen weitere Einnahme von Irenat 3 x 20 gtt für 14 Tage)
- iv Prämedikation bei Jodallergie möglich: H1-Blocker, H2-Blocker und Kortison 2 h bis 30 min vor der Untersuchung; Patient muss in Begleitung erscheinen!

Für weitere Fragen zu unserem Leistungsspektrum sowie zur Untersuchungsvorbereitung stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch unter **0700 72 34 66 90** zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen

Ihr **RADIOOZ** Team