

## Informationen für zuweisende Ärztinnen und Ärzte

### MRT

**\*Kontraindikationen:**

- Schwangerschaft in den ersten 3 Monaten; danach strenge Indikationsstellung
- elektronische Geräte wie Herzschrittmacher, Insulinpumpe, Innenohrimplantat, Neurostimulator, etc.
- nach Gelenkprothesenanlage innerhalb der ersten 6 Wochen

**\*Sedierung bei Platzangst möglich; Patient muss in Begleitung erscheinen!**

**\*MRT Abdomen (insbes. Abklärung der Gallenwege) nur nüchtern (mind. 8h)**

**\*wir verwenden ausschließlich Gadolinium-haltige Kontrastmittel der höchsten Sicherheitsstufe**

### CT und Durchleuchtung

**\*Kontraindikationen:**

- Schwangerschaft
- Kinder und Jugendliche nur bei strengster Indikationsstellung

### Untersuchungen mit jodhaltigem Kontrastmittel (CT und Durchleuchtung)

**\*Kontraindikationen:**

- Multiplem-Myelom (keine absolute KI)
- eingeschränkte Nierenfunktion (erhöhtes KREA, altersangepasst)

**\*wir benötigen aktuelle Blutwerte: Kreatinin, GFR, TSH basal**

**\*Metformin: 2 Tage vor und 2 Tage nach der Untersuchung pausieren**

**\*bei TSH-basal < 0,27 bitten wir im Vorfeld der Untersuchung um eine endokrinologische Abklärung; sofern uns keine anderen Informationen vorliegen, verabreichen wir dem Patienten mit subklinischer oder manifester Hyperthyreose vor der Untersuchung 40 gtt Irenat (wir empfehlen in diesen Fällen weitere Einnahme von Irenat 3 x 20 gtt für 14 Tage)**

**\*iv Prämedikation bei Jodallergie möglich: H1-Blocker, H2-Blocker und Kortison 2 h bis 30 min vor der Untersuchung; Patient muss in Begleitung erscheinen!**

Für weitere Fragen zu unserem Leistungsspektrum sowie zur Untersuchungsvorbereitung stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch unter **08654 2772** zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen,

Ihr **RADIOOZ** Team